

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento PSR 214

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE DELLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria

ZONA OPERATIVA DI OVADA

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 8 del 02/08/2011

FASE FENOLOGICA: INVAIATURA GRAPPOLO

PERONOSPORA

L'ANTICIPO FENOLOGICO DELL'ANNATA RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI , PORTA A CONSIDERARE QUESTO TRATTAMENTO COME L'ULTIMO DELLA STAGIONE 2011. INTERVENIRE CON UN PRODOTTO RAMEICO (IDROSSIDO, OSSICLORURO, POLTIGLIA BORDOLESE) SU ENTRAMBI I LATI DEL FILARE AL FINE DI FAVORIRE IL PROCESSO DI ISPESAMENTO DELLA BUCCIA E QUINDI UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLA BOTRITE.

OIDIO

SU VIGNETI COLLINARI CON VEGETAZIONE ABBONDANTE SI CONSIGLIA DI MANTENERE SOTTO OSSERVAZIONE L'EVENTUALE PRESENZA DEL PATOGENO. ADDIZIONARE AL RAMEICO UNO ZOLFO BAGNABILE ALLE MASSIME DOSI CONSENTITE IN ETICHETTA. SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON CIMATURE E SFOGLIATURE PIU' DECISE SPECIE DAL LATO MENO ESPOSTO ALLE RADIAZIONI SOLARI E DI TRATTARE (SE NECESSARIO) A VEGETAZIONE ASCIUTTA NELLE ORE PIU' FRESCHE DELLA GIORNATA CON ZOLFO IN POLVERE (PERMETTE UNA MAGGIORE PENETRABILITA' NELLA VEGETAZIONE RISPETTO AI TRATTAMENTI LIQUIDI).

MUFFA GRIGIA

NEI VIGNETI AD ALTO RISCHIO INTERVENIRE ,CONSIDERANDO IL TEMPO DI CARENZA, CON UN PRODOTTO SPECIFICO LOCALIZZANDO IL TRATTAMENTO NELLA FASCIA DEI GRAPPOLI. COME INTERVENTO AGRONOMICO SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UNA SFOGLIATURA (SENZA ECCESSI) NELLA ZONA GRAPPOLI PER FAVORIRE UN MAGGIORE ARIEGGIAMENTO.

FLAVESCENZA DORATA

SI RICORDA CHE IL TRATTAMENTO INSETTICIDA E' OBBLIGATORIO .

SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.

Ufficio Consorzio 0143/835762
Coltivatori Diretti 0143/86268
Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083
Unione Agricoltori 0143/86307
Cantina Tre Castelli 0143/85136